

Hoitava eläinlääkäri Valtteri Lintula

27.3.2026

1 / 2

Hoito-ohjeet sekä lääke- ja laitemaksuerittely:

Tuulilaukka Oy

Lääkkeen verollinen hinta Sis. alv

Olivia De Bos

Käytetyt lääkkeet

27.3.2026 Equisedan vet 10mg/ml inj.	0,4 ml	3,32 €	käytetty
Käyttötarkoitus: Rauhoitus/anestesia			

Varoajat:

Doping (Hippos) 4 vrk, Doping (Hippos) 4 vrk, Maito ,5 vrk, Teurastus 2 vrk

27.3.2026 Torpudor 10 mg/ml 10ml	0,4 ml	5,67 €	käytetty
Käyttötarkoitus: Rauhoitus/anestesia			

Varoajat:

Doping (Hippos) 6 vuorokautta, Maito 0 vrk, Teurastus 0 vrk

Olivia De Bos:
Kasvurajakuvaus.

Röntgenkuvissa nähtävissä mtj kintereiden tibian keskiharjanteissa irtokappaleet. Vtj lateraalisen nujuluun alla todennäköinen birkeland-irtokappale. Suositellaan kirurgista poistoa, kuvat lähetetty arvioitavaksi Tampereen Hevosklinikalle.

Luna De Bos:

Eläinlääkäri Valtteri Lintula
Leipomontie 15B, 03400 Vihti

Kotiutusohjeet: OLIVIA DE BOS

Molemmissa kintereissä tibian keskiharjanteessa irtokappaleet, jotka poistettiin täyhystysleikkauksessa. Nivelrustot olivat hyvässä kunnossa.

JATKOHOITO

Seuraa että hevonen juo ja syö normaalisti seuraavien päivien aikana. Lisävesiastia on suositeltava, jotta nähdään että hevonen juo varmasti riittävästi. Seuraa hevosen ruumiinlämpöä ja liikkumista. Nukutuksen jälkeisinä päivinä voi lämpö olla jonkin verran koholla mutta jos hevosella on toipilasaikana kuumetta tai se on ontuu, ole yhteydessä klinikkaan.

LÄÄKITYS: Equibactin 450 kg mukaan **suun kautta kahdesti päivässä** 6 päivän ajan. Metacam 350 kg mukaan **suun kautta kerran päivässä** 4 päivän ajan. **Lääkitys aloitetaan huomenna.**

SITEENVAIHTO: Teipit pois kintereistä 4 pv kuluttua. Aikaisemmin jos likaantuvat tai puristavat. Säärellä oleva pintelikääre avataan ja vaihdetaan päivittäin. Sen jälkeen ei kääreitä. Tikkien päälle Bacibact voidetta 2 x päivässä kahden viikon ajan. Suosittelemme kertakäyttöhanskojen käyttöä. Haavoja ei saa pestä vedellä. Voi harjata ja rasvata sen jälkeen.

Hevonen on saanut vasempaan takajalkaan haavautumia säärelle ja kintereen alueelle kuljetuksen aikana. Osa kintereen haavoista on lähellä leikkaushaavoja. Tästä syystä johtuen, kun kääre on otettu pois, jatketaan haavojen hoitoa paikallisesti Terra-Poly salvalla, jotta haavat eivät jää tulehtuneeksi ja kontaminoi leikkaushaavoja. HUOM! On tärkeää hoitaa ommeltuja leikkaushaavoja ja kuljetuksessa syntyneitä haavoja eri voiteella ja vaihtaa kertakäyttökäsineet välissä, jotta mahdollisia tulehduseritteitä ei kulkeutuisi leikkaushaavoihin.

TIKIT POIS: **Kahden viikon kuluttua.**(voi ottaa itse pois, tikit ovat itsestään sulavia joten jos tuntuu että jotain jää, ei haittaa)

KARSINASSA: 2 viikkoa. Hyvä karsinahygienia on ehdottoman tärkeää toipilasaikana. Huolehdi, että karsinassa on riittävästi puhdasta kuiviketta. Karsina tulisi puhdistaa kahdesti päivässä. Emme suosittele turvekuivutusta leikkauspotilaille.

KÄVELYÄ/SAIRASTARHA: Aloitetaan 2 viikon kuluttua, pyritään pitämään rauhassa pienessä tarhassa 2 vkoa. Pyritään lisäämään rasiutusta asteittain. Voi myös kävelyttää narusta.

VAPAA TARHAUS/LAIDUN: Kun haavat ovat hyvin parantuneet, aikaisintaan 1kk kuluttua leikkauksesta.

Jos teillä on kysyttävää, soittakaa tai laittakaa sähköpostia info@tampereenhevosklinikka.fi. Päivystysaikana kiireellisissä tapauksissa ottakaa yhteyttä oman alueenne päivystävään eläinlääkäriin. Lisätietoa ja ohjevideoita leikkauksen jälkihoidosta (mm. siteen vaihto ja tikkien poisto) löydätte nettisivuiltamme www.tampereenhevosklinikka.fi

Huom! Leikattu hevonen tulee pitää erillään kilpahevosista lääkevaroaikojen vuoksi (ei kilpahevosta samaan karsinaan/tarhaan).

Lääkkeet:

Midazolam 1 ml, doping 4 vrk (Hippos), liha 6 kk (Käytetty)
6 ml

Attane vet 1 ml Doping 4 vrk (Hippos), Liha 2 vrk (Käytetty)
50 ml

Flunixin doping 14 vrk (Hippos), Liha 28 vrk (Käytetty)
9 ml

Domosedan + Torphadine 1 ml + 1 ml, doping 6 vrk (Hippos), liha 2 vrk (Käytetty)
1 pkt

Lincocin 1 ml, doping 14 vrk (Hippos), liha 6 vrk (Käytetty)
1 ml

Sedivet doping 5 vrk (Hippos), liha 10 vrk (Käytetty)
0.8 ml

Bacibact, dopingvaroaika 4 vrk (Hippos), Liha 28 vrk (Luovutettu)
1 kpl

Plegicil inj. 1 ml, doping 7 vrk (Hippos), liha 6 kk (Käytetty)
0.7 ml

Ketador 1 ml, doping 4 vrk (Hippos), liha 0 (Käytetty)
9 ml

Geopenil, doping 14 vrk (Hippos), liha 10 vrk (Käytetty)
0.625 pullo

Terra-Poly 28 g, doping 4 vrk (Hippos), liha 0 vrk (Luovutettu)
1 x 28g

THIS IS AN INVOICE