

Eläin:ON YOUR MARKS HOSS (42767)
hevonen
Tamma, 15.5.2025**Asiakas:**

MTY HÄRMÄLÄ / HÄRMÄLÄ VILJAMI (21827)

SUKKISTENTIE 50
21270 NOUSIAINEN
Suomi
Viljami@sukkinen.com
+358 44 0160187**Käynti (1): 7.5.2026 - 7.5.2026**

Käynnistä vastannut henkilö: Elfving Kimmo

Kotiutusohjeet:

DIAGNOOSI: Vasemman takajalan kintereessä tibian keskiharjanteessa irtokappale ja mediaalisessa malleoluksessa irtokappale.

Oikean takajalan vuohisnivelessä sisäpuolisen nujuluun alla birkeland irtokappale.

TEHDYT HOITOTOIMENPITEET: Artroskopiatutkimus. Irtokappaleet poistettiin ja muutosalueet siivottiin. Nivelissä ei ollut kulumauria.

Sudenhampaat poistettiin.

JATKOHOITO

Seuraa että hevonen juo ja syö normaalisti seuraavien päivien aikana. Lisävesiastia on suositeltava, jotta nähdään että hevonen juo varmasti riittävästi. Seuraa hevosen ruumiinlämpöä ja liikkumista. Nukutuksen jälkeisinä päivinä voi lämpö olla jonkin verran koholla mutta jos hevosella on toipilasaikana kuumetta tai se on ontuu, ole yhteydessä klinikkaan.

LÄÄKITYKSET: Ethacilin 30 ml **kerran päivässä lihakseen** 6 päivän ajan. Metacam -mikstuura 350 kg mukaan **kerran päivässä suun kautta** 4 päivän ajan. **Lääkitys aloitetaan huomenna.**

SITEENVAIHTO KINNER: Teippi pois kintereestä 4 pv kuluttua, aikaisemmin jos likaantuu tai alkaa hangata. Säärellä oleva pintelikääre avataan ja vaihdetaan päivittäin. Sen jälkeen ei kääreitä. Laita tikkien päälle Bacibact -salvaa 2 x päivässä tikkien poistoon saakka ja pari päivää ylikin. Suosittelemme kertakäyttöhanskojen käyttöä. Haavoja ei saa pestä vedellä kahteen viikkoon. Voi harjata puhtaalla harjalla ja rasvata sen jälkeen.

SITEENVAIHTO VUOHINEN: Side vaihdetaan ensimmäisen kerran 7 päivän kuluttua. Sen jälkeen pidetään tukevaa sidettä vielä kahden viikon ajan (tai pidempään, jos jalat turvottelevat). Side vaihdetaan päivittäin tai joka toinen päivä. Siteenvaihdon yhteydessä tikkien päälle levitetään Bacibact-voidetta. Suosittelemme kertakäyttöhanskojen käyttöä.

TIKIT POIS: Kahden viikon kuluttua.

KARSINASSA: Kaksi viikkoa. Hyvä karsinahygienia on ehdottoman tärkeää toipilasaikana. Huolehtikaa, että karsinassa on riittävästi puhdasta kuiviketta. Karsina tulisi puhdistaa kahdesti päivässä. Emme suosittele turvekuivitusta leikkauspotilaille.

KÄVELYÄ/SAIRASTARHA: Aloitetaan 2 viikon kuluttua, pyritään pitämään rauhassa pienessä tarhassa 2 vkoa. Pyritään lisäämään rasitusta asteittain. Voi myös kävelyttää narusta.

VAPAA TARHAUS/LAIDUN: Kun haavat ovat hyvin parantuneet, aikaisintaan 1kk kuluttua leikkauksesta.

Lisäyksiä: Hevosessa todettiin väiveitä. Hoidetaan Spotinorilla.

Jos teillä on kysyttävää, soittakaa tai lähetäkää sähköpostia info@tampereenhevosklinikka.fi. Päivystysaikana kiireellisissä tapauksissa ottakaa yhteyttä oman alueenne päivystävään eläinlääkäriin. Ohjevideoita leikkauksen jälkihoitoon (mm. siteenvaihto, tikkien poisto) löydätte osoitteesta www.tampereenhevosklinikka.fi/videokirjasto

Huom! Leikattu hevonen tulee pitää erillään kilpahevosista lääkevaroaikojen vuoksi (ei kilpahevosia samaan karsinaan/tarhaan).

Lääkkeet:

Midazolam 1 ml, doping 4 vrk (Hippos), liha 6 kk (Käytetty)
6 ml

Attane vet 1 ml Doping 4 vrk (Hippos), Liha 2 vrk (Käytetty)
50 ml

Flunixin doping 14 vrk (Hippos), Liha 28 vrk (Käytetty)
9 ml

Domosedan + Torphadine 1 ml + 1 ml, doping 6 vrk (Hippos), liha 2 vrk (Käytetty)
0.8 pkt

Lincocin 1 ml, doping 14 vrk (Hippos), liha 6 vrk (Käytetty)
1 ml

Sedivet doping 5 vrk (Hippos), liha 10 vrk (Käytetty)
1 ml

Bacibact, dopingvaroaika 4 vrk (Hippos), Liha 28 vrk (Luovutettu)
1 kpl

Plegicil inj. 1 ml, doping 7 vrk (Hippos), liha 6 kk (Käytetty)
0.8 ml

Ketador 1 ml, doping 4 vrk (Hippos), liha 0 (Käytetty)
10 ml

Geepenil, doping 14 vrk (Hippos), liha 10 vrk (Käytetty)
0.625 pullo

Ethacilin 100 ml, doping 14 vrk (Hippos), liha 14 vrk (Luovutettu)
2 x 100ml

Metacam 100 ml, doping 14 vrk (Hippos), liha 3 vrk (Luovutettu)
1 pkt

Spotinor 10 mg/ml 500 ml. Dopingvaroaika ei kilpailupäivänä (Hippos), liha 35 vrk (Luovutettu)
1 x 1 pkt
