

Kotiutusohjeet: VIVA DE BOS

23.4.2026 Kristiina Ertola

Kuvattu kasvuhäiriöiden varalta mej vuohiset ja alanivelet sekä mtj polvet, kintereet ja vuohiset

Otj vuohisessa sisäpuolisen nujuluun alla irtokappale (Birkeland)

Vtj polven telassa hyvin pieni harventuma (lievä kasvuhäiriö) millä todennäköisesti ei merkitystä

Muuten ei merkittäviä muutoksia

27.4.2026 Kimmo Elfving

Oikeassa takajalassa mediaalisen nujuluun alla suurikokoinen birkeland-irtokappale, joka poistettiin tähystysleikkauksessa. Nivelrustot olivat hyvässä kunnossa.

Sudenhampaat poistettiin yläleuasta molemmin puolin.

JATKOHOITO:

Seuraa että hevonen juo ja syö normaalisti seuraavien päivien aikana. Lisävesiastia on suositeltava, jotta nähdään että hevonen juo varmasti riittävästi. Seuraa hevosen ruumiinlämpöä ja liikkumista. Nukutuksen jälkeisinä päivinä voi lämpö olla jonkin verran koholla mutta jos hevosella on toipilasaikana kuumetta tai se on ontuu, ole yhteydessä klinikkaan.

LÄÄKITYS: Equibactin 300 kg mukaan **suun kautta kahdesti päivässä** 6 päivän ajan. Metacam 300 kg mukaan **suun kautta kerran päivässä** 4 päivän ajan. **Lääkitys aloitetaan huomenna.**

SITEENVAIHTO: Side vaihdetaan ensimmäisen kerran 7 päivän kuluttua. Sen jälkeen pidetään tukevaa sidettä vielä kahden viikon ajan (tai pidempään, jos jalat turvottelevat). Side vaihdetaan päivittäin tai joka toinen päivä. Siteenvaihdon yhteydessä tikkien päälle levitetään Bacibact-voidetta. Suosittelemme kertakäyttöhanskojen käyttöä.

TIKIT POIS: **Kahden viikon kuluttua.** Tikit voi ottaa itse pois, langat ovat itsestään sulavia, joten ei haittaa, vaikka jotain jäisi.

KARSINASSA: Kaksi viikkoa. Hyvä karsinahygienia on ehdottoman tärkeää toipilasaikana. Huolehtikaa, että karsinassa on riittävästi puhdasta kuiviketta. Karsina tulisi puhdistaa kahdesti päivässä. Emme suosittele turvekuivutusta leikkauspotilaille.

KÄVELYÄ/SAIRASTARHA: Aloitetaan 2 viikon kuluttua, pyritään pitämään rauhassa pienessä tarhassa 2 vkoa. Pyritään lisäämään räsistusta asteittain. Voi myös kävelyttää narusta.

VAPAA TARHAUS/LAIDUN: Kun haavat ovat hyvin parantuneet, aikaisintaan 1kk kuluttua leikkauksesta.

Jos teillä on kysyttävää, soittakaa tai lähetäkää sähköpostia info@tampereenhevosklinikka.fi. Päivystysaikana kiireellisissä tapauksissa ottakaa yhteyttä oman alueenne päivystävään eläinlääkäriin. Lisätietoa ja ohjevideoita leikkauksen jälkihoidosta (mm. siteen vaihto ja tikkien poisto) löydätte nettisivuiltamme www.tampereenhevosklinikka.fi

Huom! Leikattu hevonen tulee pitää erillään kilpahevosista lääkevaroaikojen vuoksi (ei kilpahevosia samaan karsinaan/tarhaan).

Lääkkeet:

Domosedan + Torphadine 0,5 + 0,5 ml, doping 6 vrk (Hippos), liha 2 (Käytetty)
1 x 1 pkt

Flunixin doping 14 vrk (Hippos), Liha 28 vrk (Käytetty)
6 ml

Domosedan + Torphadine 1 ml + 1 ml, doping 6 vrk (Hippos), liha 2 vrk (Käytetty)
1.2 pkt

Sedivet doping 5 vrk (Hippos), liha 10 vrk (Käytetty)
0.7 ml

Midazolam 1 ml, doping 4 vrk (Hippos), liha 6 kk (Käytetty)
5 ml

Attane vet 1 ml Doping 4 vrk (Hippos), Liha 2 vrk (Käytetty)
50 ml

Lincocin 1 ml, doping 14 vrk (Hippos), liha 6 vrk (Käytetty)
0.5 ml

Bacibact, dopingvaroaika 4 vrk (Hippos), Liha 28 vrk (Luovutettu)
1 kpl

THIS IS AN INVOICE