

Kotiutusohjeet: FANCY NANCY

TEHDYT HOITOTOIMENPITEET: Artroskopiautkimus.

Vasemmassa kintereessä tibian keskiharjanteessa irtokappale, joka poistettiin. Sen lisäksi mediaalisessa malleoluksessa pienikokoinen irtokappale, joka poistettiin.

Oikeassa kintereessä mediaalisessa malleoluksessa irtokappale, joka poistettiin.

Nivelrustot oli molemmissa kintereissä hyvässä kunnossa.

Sudenhampaat ylhäältä poistettiin.

JATKOHOITO

Seuraa että hevonen juo ja syö normaalisti seuraavien päivien aikana. Lisävesiastia on suositeltava, jotta nähdään että hevonen juo varmasti riittävästi. Seuraa hevosen ruumiinlämpöä ja liikumista. Nukutuksen jälkeisinä päivinä voi lämpö olla jonkin verran koholla mutta jos hevosella on toipilasaikana kuumetta tai se on ontuu, ole yhteydessä klinikkaan.

LÄÄKITYS: Ethacilin 30 ml lihakseen kerran päivässä 6 päivän ajan. Metacam 350 kg mukaan suun kautta kerran päivässä 5 päivän ajan. Lääkitys aloitetaan huomenna.

SITEENVAIHTO: Teipit pois kintereistä 4 pv kuluttua. Aikaisemmin jos likaantuvat tai puristavat. Sen jälkeen ei kääreitä. Tikkien päälle Bacibact rasvaa 2 x päivässä kahden viikon ajan. Suosittelemme kertakäyttöhanskojen käyttöä. Haavoja ei saa pestä vedellä. Voi harjata ja rasvata sen jälkeen.

TIKIT POIS: Kahden viikon kuluttua.(voi ottaa itse pois, tikit ovat itsestään sulavia joten jos tuntuu että jotain jää, ei haittaa)

KARSINASSA: 2 viikkoa. Hyvä karsinahygienia on ehdottoman tärkeää toipilasaikana. Huolehtikaa, että karsinassa on riittävästi puhdasta kuiviketta. Karsina tulisi puhdistaa kahdesti päivässä. Emme suosittele turvekuivitusta leikkauspotilaille.

KÄVELYÄ/SAIRASTARHA: Aloitetaan 2 viikon kuluttua, pyritään pitämään rauhassa pienessä tarhassa 2 vkoa. Pyritään lisäämään rasiitusta asteittain. Voi myös kävelyttää narusta.

VAPAA TARHAUS/LAIDUN: Kun haavat ovat hyvin parantuneet, aikaisintaan 1kk kuluttua leikkauksesta.

Jos teillä on kysyttävää, soittakaa tai lähettäkää sähköpostia info@tampereenhevosklinikka.fi. Ohjevideoita leikkauksen jälkihoitoon (mm. siteenvaihto, tikkien poisto) löydätte osoitteesta www.tampereenhevosklinikka.fi/videokirjasto

Huom! Leikattu hevonen tulee pitää erillään kilpahevosista lääkevaraoiden vuoksi (ei kilpahevosta samaan karsinaan/tarhaan).

Lääkkeet:

Flunixin doping 14 vrk (Hippos), Liha 28 vrk (Käytetty)
8 ml

Ketador 1 ml, doping 4 vrk (Hippos), liha 0 (Käytetty)
9 ml

Sedivet doping 5 vrk (Hippos), liha 0 vrk (Käytetty)
1.4 ml

Attane vet 1 ml Doping 4 vrk (Hippos), Liha 2 vrk (Käytetty)
50 ml

Domosedan + Torphadine 1 ml + 1 ml, doping 6 vrk (Hippos), liha 0 vrk (Käytetty)
1 pkt

Midazolam 1 ml, doping 4 vrk (Hippos), liha 6 kk (Käytetty)
5 ml

Plegicil inj. 1 ml, doping 7 vrk (Hippos), liha 6 kk (Käytetty)
1 pkt

Geepenil, doping 14 vrk (Hippos), liha 10 vrk (Käytetty)
50 ml

Ethacilin 100 ml, doping 14 vrk (Hippos), liha 14 vrk (Luovutettu)